

包皮環割術

包在陰莖頭上的一層皮俗稱爲「包皮」。對於應否將男嬰的包皮割掉意見紛紜。有人贊成盡早替嬰兒割掉，也有人認爲應讓它自然發育。不過，也有些因爲宗教信仰需要把包皮割掉的，而有些則是個別家庭的愛好或個人衛生理由才做環割手術的。本人認爲無需做包皮環割術，除非出現以下的情況。

一、假如包皮不能向後翻起，陰莖頭露不出來，使陰莖頭遺留的膿質分泌物在皮

層底下積聚起來，引起刺激和發炎。

二、若果包皮很容易地向後翻起，而且還保持着向後捲起的姿勢，使流入的血液不能正常地回流出去，這樣便會令包皮的皮層脹大，緊緊着陰莖頭，使其疼痛。如這種情形發生過多次的話，便應接受手術治療。

三、最值得注意的是非做包皮環割手術不可的，就是當發現生有霉菌和發炎時，而這個時候的治療工作其實也是比較困難，

因爲包皮的皮層開始變硬，有如皮革般，而且會出現裂痕。到了這個時候，便得儘快做包皮環割手術。

其實更重要的就是不要替嬰兒做包皮環割術。原因是嬰兒的陰莖有可能會發育畸形，例如出現彎曲現象或是尿道口不是在正常的陰莖頂端，而是長在側旁等地方。當矯正手術時最好能使用包皮的皮，所以必需暫且保留着，直到嬰孩生長到二歲左右，便可接受矯正手術。如果包皮已經一早被切掉，對於施行矯正手術就會比較困難，成功率也會降低，假如對新生男嬰的陰莖發育有任何疑問，應該找兒科，更適合的便應找泌尿科專家診斷。在進行包皮環割術前請教醫生的指示。（以上資料由高盟醫生泌尿科中心提供，電話（二二二）九二五八三八八。）